

Торговое наименование Форцил	Рекомендации по применению Режим дозирования Режим приема препарата врач устанавливает индивидуально в зависимости от показаний к применению, тяжести и локализации инфекции. У детей и подростков, определяют чувствительность возбудителя к препарату, функцию почек и массу тела пациента. Для лечения заболеваний, вызванных грамотрицательными возбудителями, а также таких заболеваний, как воспалительные заболевания органов малого таза, внутрибольничные инфекции, инфекции у пациентов с низким количеством нейтрофилов, инфекции костей и суставов, в зависимости от вида возбудителя могут потребоваться более высокие дозы препарата Форцил или/и одновременно назначение других антибактериальных препаратов. Взрослые <i>Инфекции нижних дыхательных путей:</i> 500-750 мг, 2 раза в день, 7-14 дней. <i>Инфекции верхних дыхательных путей:</i> 500-750 мг, 2 раза в день, 7-14 дней. <i>Обострение хронического синусита:</i> по 500-750 мг 2 раза в день, 7-14 дней. <i>Хронический гнойный средний отит:</i> по 500-750 мг 2 раза в день, 7-14 дней. <i>Осложненный наружный отит:</i> по 500-750 мг 2 раза в день, не менее 10 дней, в особом случае (например, при абсцессе) возможна длительность лечения более 21 дня. <i>Бактериальный простатит:</i> по 500-750 мг 2 раза в день, от 2 до 4 недель (при острой форме) и 4-6 недель (при хронической форме). <i>Инфекции половых путей</i> <i>Воспаление мочеиспускательного канала и шейки матки, вызванное чувствительной зоноккокковой инфекцией:</i> однократно 2 раза в день, 500-750 мг 2 раза в день, от 5 до 14 дней. <i>Воспаление яичка и его придатка, воспалительные заболевания органов малого таза, вызванные чувствительной зоноккокковой инфекцией:</i> по 500-750 мг 2 раза в день, не менее 14 дней. <i>Инфекции мочевыводящих путей и внутрибольничные инфекции</i> <i>Частый ложный приступ, вызванный бактериями (кроме кишечной палочки, вызывающей диарею) от 1 типа и неизвестного возбудителя (тяжелая диарея путешественников):</i> по 500 мг два раза в день, 1 день. <i>Инфекционная диарея (в том числе вызванная возбудителем диареи от 3 типа):</i> по 500 мг два раза в день, 5 дней. <i>Диарея, вызванная возбудителем колеры:</i> по 500 мг два раза в день, 3 дня. <i>Бронхит тип:</i> по 500 мг два раза в день, 7 дней. <i>Внутривенный инфузий:</i> по 500-750 мг 2 раза в день, от 5 до 14 дней. <i>Инфекции кожи и мягких тканей:</i> по 500-750 мг два раза в день, 7-14 дней. <i>Инфекции костей и суставов:</i> по 500-750 мг два раза в день, максимум до 3-х месяцев. Лечение или профилактика инфекционных заболеваний у пациентов с низким содержанием в крови нейтрофилов, лейкоцитов и лимфоцитов: (обычно в комбинации с другим антибиотиком (ами)) по 500-750 мг два раза в день, в течение всего периода низкого содержания в крови нейтрофилов лейкоцитов. Профилактика пролежней и лечение легочной формы сибирской язвы у пациентов, способных принимать пероральные лекарственные формы препаратов (начинать следует как можно быстрее после предполагаемого или подтвержденного воздействия): по 500 мг два раза в день, 60 дней с момента подтверждения воздействия возбудителя сибирской язвы, лечение следует начинать как можно скорее после предполагаемого или подтвержденного воздействия. Дети и подростки При отсутствии других подходящих лекарственных препаратов, лечение детей и подростков препаратом Форцил может проводиться при следующих заболеваниях. <i>Кишечный фиброз (муковисцидоз):</i> по 20 мг/кг массы тела, 2 раза в день, 10-14 дней. <i>Осложненные инфекции мочевыводящих путей и пневмония:</i> по 10 мг/кг массы тела до 20 мг/кг массы тела (максимальная доза на один прием 750 мг), 2 раза в день, 10-21 день. <i>Постоперативная профилактика и лечение легочной формы сибирской язвы у пациентов, способных принимать пероральную форму препарата:</i> по 10-15 мг/кг массы тела (максимальная доза на один прием 750 мг) 2 раза в день, 60 дней с момента подтверждения воздействия возбудителя, лечение следует начинать как можно скорее после предполагаемого или подтвержденного воздействия. <i>Другие тяжелые инфекции:</i> 20 мг/кг массы тела (максимальная доза на один прием 750 мг), 2 раза в день, в соответствии с видом возбудителя. Действие препарата у детей с заболеваниями почек или печени не изучали. <i>Пациенты пожилого возраста:</i> назначается доза, соответствующая тяжести заболевания и с учетом состояния почек. <i>Пациенты с нарушением функции печени и почек:</i> для пациентов с заболеваниями почек, врач индивидуально подбирает дозу препарата, лечение проводится под строгим контролем. При нормальной функции почек: назначается обычная дозировка. Умеренно выраженная почечная недостаточность: по 250-500 мг каждые 12 часов; При тяжелых нарушениях: по 250-500 мг каждые 24 часа; Пациентам на гемодиализе: по 250-500 мг, каждые 24 часа (после диализа); Пациентам на перитонеальном диализе: по 250-500 мг, каждые 24 часа. Пациентам с нарушением функции печени, коррекция дозы не требуется.
Международное непатентованное название Ципрофлоксацин	
Лекарственная форма, дозировка Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг	
Фармакотерапевтическая группа Противомикробные препараты для системного использования. Антибактериальные препараты системного применения. Противомикробные препараты – производные хинолона. Фторхинолоны. Ципрофлоксацин. Код АТХ J01MA02	
Показания к применению Взрослые Заболевания нижних дыхательных путей, вызванные грамотрицательными бактериями: • обострение хронической обструктивной болезни легких (только в тех случаях, когда другие антибиотики, обычно рекомендуемые для лечения этих инфекций, считаются неприемлимыми) • бронхолегочные инфекции при муковисцидозе или бронхитах • пневмония. Хронический гнойный средний отит, обострение хронического синусита (особенно, если он вызван грамотрицательными бактериями). Инфекции мочевыводящих путей: • неосложненный острый цистит (только в тех случаях, когда другие антибиотики, обычно рекомендуемые для лечения этих инфекций, считаются неприемлимыми) • острый пиелонефрит • осложненные инфекции мочевыводящих путей • бактериальный простатит. Инфекции половых путей: • гонорейный уретрит и цервицит (вызванные чувствительной <i>Neisseria gonorrhoeae</i>) • элидидомикрот, воспалительные заболевания органов малого таза (в том числе вызванные чувствительной <i>Neisseria gonorrhoeae</i>). Инфекции желудочно-кишечного тракта (например, диарея путешественников). Внутрибольничные инфекции. Инфекции кожи и мягких тканей, вызванные грамотрицательными бактериями. Инфекции при перитонеальном диализе. Инфекции костей и суставов. Профилактика <i>invasive</i> заболеваний, вызванных менингококковой инфекцией. Легочная форма сибирской язвы (постоперативная профилактика и радикальное лечение). Лечение пациентов с нетронутой и легкой формой (при подозрении, что возбудитель вызвана Бактериальной инфекцией). Дети и подростки Инфекции костей и суставов, вызванные <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , на фоне муковисцидоза. Осложненные инфекции мочевыводящих путей и пневмония. Постоперативная профилактика и лечение легочной формы сибирской язвы у пациентов, способных принимать пероральные лекарственные формы препаратов (начинать следует как можно быстрее после предполагаемого или подтвержденного воздействия): по 500 мг два раза в день, 60 дней с момента подтверждения воздействия возбудителя сибирской язвы, лечение следует начинать как можно скорее после предполагаемого или подтвержденного воздействия. Дети и подростки При отсутствии других подходящих лекарственных препаратов, лечение детей и подростков препаратом Форцил может проводиться при следующих заболеваниях. <i>Кишечный фиброз (муковисцидоз):</i> по 20 мг/кг массы тела, 2 раза в день, 10-14 дней. <i>Осложненные инфекции мочевыводящих путей и пневмония:</i> по 10 мг/кг массы тела до 20 мг/кг массы тела (максимальная доза на один прием 750 мг), 2 раза в день, 10-21 день. <i>Постоперативная профилактика и лечение легочной формы сибирской язвы у пациентов, способных принимать пероральную форму препарата:</i> по 10-15 мг/кг массы тела (максимальная доза на один прием 750 мг) 2 раза в день, 60 дней с момента подтверждения воздействия возбудителя, лечение следует начинать как можно скорее после предполагаемого или подтвержденного воздействия. <i>Другие тяжелые инфекции:</i> 20 мг/кг массы тела (максимальная доза на один прием 750 мг), 2 раза в день, в соответствии с видом возбудителя. Действие препарата у детей с заболеваниями почек или печени не изучали. <i>Пациенты пожилого возраста:</i> назначается доза, соответствующая тяжести заболевания и с учетом состояния почек. <i>Пациенты с нарушением функции печени и почек:</i> для пациентов с заболеваниями почек, врач индивидуально подбирает дозу препарата, лечение проводится под строгим контролем. При нормальной функции почек: назначается обычная дозировка. Умеренно выраженная почечная недостаточность: по 250-500 мг каждые 12 часов; При тяжелых нарушениях: по 250-500 мг каждые 24 часа; Пациентам на гемодиализе: по 250-500 мг, каждые 24 часа (после диализа); Пациентам на перитонеальном диализе: по 250-500 мг, каждые 24 часа. Пациентам с нарушением функции печени, коррекция дозы не требуется.	
Перечень сведений, необходимых до начала применения Противопоказания • гиперчувствительность к действующему веществу и антибактериальным препаратам группы хинолонов или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1 • одновременное применение с тизанидином.	
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами Влияние других лекарственных препаратов на действие препарата Форцил <i>Лекарственные препараты, влияющие на сократительную способность сердца:</i> с осторожностью следует применять Форцил одновременно с препаратами, влияющими на сократительную способность сердца (например, противомикробные препараты I и II класса, трициклические антидепрессанты, макролиды, нейролептики). <i>Образование комплексов макро и микроэлементов:</i> после одновременного приема с лекарственными препаратами, содержащими кальций, магний, алюминий, железо и бифурные системы, возможно образование комплексов и уменьшение всасывания ципрофлоксацина. К таким препаратам относятся, например, препараты связывающие фосфаты (селевалер и карбонат лантана), препараты, снижающие всасывание микроэлементов (например, некоторые противораковые препараты (дифосфонаты) и др. При применении таких комбинаций, препарат Форцил следует принимать либо за 2 часа до или через 4 часа после их приема. Данное ограничение не распространяется на препараты, снижающие кислотность в желудке и содержащиеся в блокаторах H2-рецепторов. <i>Продукты питания и молочные продукты:</i> могут ослаблять действие препарата Форцил, поэтому следует избегать одновременного применения с молочными или обогащенными минералами продуктами (например, молоко, йогуртом, альпийскими сырами с повышенным содержанием кальция). Эти продукты и напитки следует принимать отдельно от препарата и отдельно от еды. Препарат Форцил необходимо принимать за 2 часа до или через 4 часа после употребления молочных продуктов или напитков, обогащенных минералами. <i>Проблемы:</i> может усилить действие препарата Форцил. Метоклопрамид может усилить действие препарата Форцил. Омепразол может незначительно ослабить действие препарата Форцил. Влияние ципрофлоксацина на другие лекарственные средства Теофиллин: возможно значительное усиление действия теофиллина, что может проявиться снижением кровяного давления и седативным эффектом (с уменьшением раздражительности и сонливостью эффектом). Метопролол: возможно усиление действия метопролола и развитие побочных реакций, одновременное применение не рекомендуется. Госипиллин: возможно усиление действия теофиллина и развитие побочных реакций (в отдельных случаях с угрозой для жизни и даже смертельным исходом). Если их одновременное применение необходимо, врач может контролировать концентрацию теофиллина в крови и при необходимости снизить его дозу. Другие производные кофеина: кофеин; при одновременном применении препарата Форцил и средств, содержащих кофеин или пентоксифиллин (оксентиллин), возможно усиление их действия. Фенитоин: возможно усиление или снижение действия фенитоина, рекомендуется контроль уровня препарата в крови. Циклостор: при одновременном применении с Форцил, возможно нарушение работы почек, поэтому рекомендуется доза два в неделю контролировать уровень креатинина в крови. <i>Антикоагулянты:</i> влечение к снижению свертываемости крови. <i>Антиагреганты:</i> возможно усиление действия, действие аспирина, что может проявиться снижением кровяного давления и седативным эффектом. <i>Аспирин:</i> возможно значительное усиление его действия и развитие побочных реакций. <i>Золигидин:</i> возможно усиление его действия, одновременное применение с препаратом Форцил не рекомендуется. Специальные предупреждения Следует избегать применения препарата пациентам, у которых в прошлом отмечались серьезные побочные реакции при применении хинолонов и строгое соблюдение рекомендаций врача. Препарат Форцил может быть назначен только при отсутствии других возможных вариантов лечения. Тяжелые и смешанные инфекции: не рекомендуется лечение тяжелых инфекций только одним препаратом Форцил, в таких случаях для лучшего эффекта, его применяют в комбинации с другими антибактериальными препаратами. Септотоксические инфекции: не рекомендуется применение препарата из-за недостаточной эффективности при стрептококковой инфекции. Инфекции, передающиеся половым путем: воспалительные заболевания половых путей и органов малого таза, могут вызвать устойчивые к фторхинолону возбудители гонореи, поэтому перед началом лечения, может возникнуть необходимость в определении чувствительности возбудителя заболевания к препарату. Если это невозможно, препарат Форцил может применяться в комбинации с другими антибактериальными препаратами. Если через 3 дня лечения, улучшение не наступило, необходимо обратиться к лечащему врачу, так как может потребоваться коррекция лечения. Инфекции мочевыводящих путей: наиболее часто встречающаяся возбудитель заболеваний мочевыводящих путей – кишечная палочка. Она может быть не чувствительной к действию препарата Форцил, поэтому в период, предшествующий началу, продолжительность лечения неосложненного цистита может быть более длительной, чем рекомендуемая. Внутрибольничные инфекции: очень мало данных по эффективности препарата при лечении ноперационных внутрибольничных инфекций. Диарея путешественников: выбор препарата должен проводиться на основании информации по чувствительности возбудителя к препаратам Форцил, необходимо соблюдать об этом лечащему врачу. Заболевания костей и суставов: в зависимости от результатов чувствительности возбудителя заболевания, препарат можно применять в сочетании с другими антибактериальными препаратами. Легочная форма сибирской язвы: опыт применения у людей ограничен. Дети и подростки: эксперименты на животных показали, что ципрофлоксацин действует на суставы, несущие нагрузку и вызывает поражение суставов у неполовозрелых животных, поэтому у детей препаратом детей и подростков, необходимо проводить лечение с осторожностью. Бронхолегочные заболевания на фоне муковисцидоза: опыт применения у детей младше 5 лет ограничен. Осложненные инфекции мочевыводящих путей и пиелонефрит: лечение инфекций мочевыводящих путей препаратом Форцил приводит только в тех случаях, когда нет возможности применять другие методы лечения и после получения результатов лабораторного исследования. Другие специфические тяжелые инфекции: препарат применяется только тогда, когда методы лечения не могут быть применены или стандартная терапия неэффективна, а также при хороших чувствительности возбудителя заболевания (по результатам микробиологического исследования). Опыт лечения серьезных инфекций организм. Гиперчувствительность: повышенная чувствительность и аллергические реакции, включая анафилактический шок и анафилактические реакции, могут быть опасными для жизни и развития даже после однократного приема. В случае развития такой реакции, прием препарата следует прекратить и срочно обратиться к врачу. Необходимость длительного лечения: в очень редких случаях может развиться стойкое, ухудшающее качество жизни и потенциально необратимые, серьезные побочные эффекты (продолжающиеся месяцами или годами). Они могут затрагивать нервные системы организма (костно-мышечную систему, нервную систему, кожу и органы чувств) и не зависят от возраста и иммунологических факторов риска. При любых признаках или симптомах серьезной нежелательной реакции, следует немедленно прекратить прием препарата и обратиться к лечащему врачу. Воспаление и разрыв сухожилий: если в прошлом отмечались заболевания сухожилий, которые развились после приема хинолонов, включая прием препарата Форцил, необходимо сообщить об этом лечащему врачу. В таких случаях, очень редко, лечение в-таки может быть назначено, но только после микробиологического подтверждения чувствительности возбудителя и при особо тяжелых инфекциях, условии неэффективности стандартного лечения и не чувствительности возбудителя к другим препаратам. При применении препарата, воспаление и разрыв сухожилий (преимущественно ахиллова), иногда с двух сторон, может развиться в первые 48 часов лечения и даже в течение нескольких месяцев после его завершения. Этот риск повышен у пожилых пациентов, при одновременном приеме с кортикостероидами (стероидами), после операции по пересадке почки, сердца или легких. Одновременного применения с кортикостероидами следует избегать. При первых признаках воспаления сухожилия (например, болезненное отек, воспаление), прием препарата Форцил необходимо прекратить и обратиться к врачу. Обострение миастении Гравис: с осторожностью следует применять препарат у пациентов с миастенией Гравис, так как симптомы миастении Гравис могут обостриться. Анемия, расширение аорты и недостаточность клапанов сердца: после применения фторхинолонов, включая прием препарата Форцил, расширение аорты, а также возможный обратный запуск крови через аортальный и митральный клапаны сердца у пожилых, при врожденном пороке клапанов сердца, имеющийся анамнезом в прошлом или у кого-то из близких родственников, при состояниях, predisposing к развитию анемии, расширение аорты, таких как: синдром Марфана, синдром Элерса-Данлоса, синдром Тернера, болезнь Бехтерева, повышение кровяного давления, ревматоидный артрит, а также при аневризме и расширении аорты (например, при таких сосудах заболевания, как артериит Такаса или гигантской клеточной атеросклероз). Шеренга, в том числе при обратном запуске крови через недостаточность сердечных клапанов (например, при инфекционном эндокардите). Синдром анемии, расширение и разрыва аорты также повышен у пожилых, одновременно проводящих лечение кортикостероидами. В случае появления рвотной боли в животе, груди или спине, необходимо немедленно обратиться к врачу для оказания серьезной помощи. В случае появления признаков одышки, учащенного сердцебиения или развития отека области живота или нижних конечностей также рекомендуется немедленно обратиться к врачу. Нарушения зрения: при появлении нарушений зрения или других нарушений в глазах, необходимо срочно проконсультироваться с окулистом. Реакция кожи на солнечный свет: в период лечения возможно развитие реакций фоточувствительности, поэтому необходимо избегать прямого воздействия солнечных лучей или ультрафиолетового излучения. Судороги: известно, что ципрофлоксацин может снижать порог судорожной готовности и вызывать судороги. Отмечались случаи судорожного развития при применении препарата Форцил в комбинации с другими препаратами. При применении препарата, воспаление и разрыв сухожилий (преимущественно ахиллова), иногда с двух сторон, может развиться в первые 48 часов лечения и даже в течение нескольких месяцев после его завершения. Этот риск повышен у пожилых пациентов, при одновременном приеме с кортикостероидами (стероидами), после операции по пересадке почки, сердца или легких. Одновременного применения с кортикостероидами следует избегать. При первых признаках воспаления сухожилия (например, болезненное отек, воспаление), прием препарата Форцил необходимо прекратить и обратиться к врачу. Пародонтологический синдром Шеренга: отмечались различные нарушения чувствительности. Если в период лечения препаратом Форцил появились такие симптомы, как боль, жжение, покраснение, опухание или слабость, прежде чем продолжить лечение и до того, чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий, следует сообщить об этом лечащему врачу. Психические реакции: они могут появиться даже после первого приема ципрофлоксацина и проявляться депрессией, психозом, суицидальными идеями или мыслями, попытками самоубийства и даже завершением самоубийством. При первых признаках этих состояний, применение препарата Форцил следует прекратить и срочно обратиться к врачу. Нарушения со стороны сердца: при применении препарата Форцил, риск нарушения сердечного ритма повышен при: • врожденных нарушениях на ЭКГ (синдром удлинения интервала QT); • одновременном применении некоторых препаратов, удлиняющих интервал QT (например, противомикробные препараты класса IA и II класса, трициклические антидепрессанты, макролиды, препараты, применяемые для лечения почечных заболеваний); • нарушениях солевого состава крови (например, снижении калия или магния); • заболеваниях сердца (например, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, редкое сердцебиение). Пациенты пожилого возраста и женщины более чувствительны к препаратам, вызывающим патологические отклонения на ЭКГ. Таким образом, если имеются вышеперечисленные факторы риска, следует проявлять осторожность при применении препарата Форцил. Нарушения уровня глюкозы в крови: при применении вои хинолонов, возможно как снижение, так и повышение уровня глюкозы в крови. Чаще это бывает при приеме препарата Форцил при одновременном применении пероральных препаратов, снижающих уровень глюкозы в крови (например, глибенкламид) или инсулина. Отмечались случаи потери сознания из-за выраженного снижения уровня глюкозы в крови, поэтому при сахарном диабете необходим тщательный контроль уровня глюкозы в крови. При значительных колебаниях уровня глюкозы в крови, следует прекратить прием препарата и срочно обратиться к врачу. Желудочно-кишечный тракт: в период лечения ципрофлоксацином или после его окончания (в том числе после приема нескольких таблеток препарата) при приеме пищи и употреблении напитков, содержащих большое количество сахара, возможно развитие тяжелой и затяжной диареи и воспаления слизистой оболочки толстого кишечника, вызванное применением антибиотика. Иногда, эти состояния могут быть опасными для жизни, возможен даже смертельный исход. В таких случаях, прием препарата следует немедленно прекратить и срочно обратиться к врачу. Препараты, уменьшающие двигательную активность кишечника в этих случаях противопоказаны. Образование кристаллов в моче: при приеме ципрофлоксацина из-за появления выраженной почечной реакции могут возникнуть образование в мочевых кристаллов, поэтому пациентам должны принимать достаточное количество жидкости. Заболевания почек: так как препарат выводится из организма через почки, для предотвращения развития побочных реакций, связанных с накоплением ципрофлоксацина в организме, при заболеваниях почек требуется коррекция дозы препарата. Печень и желчевыводящие пути: при применении ципрофлоксацина, отмечались опасные для жизни случаи развития тяжелой воспаления печени, поэтому при появлении любых симптомов заболевания печени, включая отсутствие аппетита, жажду, тошноту, зуд или боль в животе, прием препарата необходимо прекратить и срочно обратиться к врачу. Диагноз в организме фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы: при применении ципрофлоксацина у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы может развиться малокровие из-за преждевременного разрушения красных клеток крови (гемолитической реакции). Устойчивость к действию препарата: в период лечения ципрофлоксацином или после его завершения, возможно снижение чувствительности возбудителя к препарату и ухудшение течения заболевания или присоединение другой инфекции, особенно при длительном применении или/и лечении внутривенными инъекциями. Возможные лекарственные взаимодействия: при одновременном применении с ципрофлоксацином, возможно усиление действия таких препаратов, как теофилин, клозапин, оланоприл, тизанидин, теофиллин, дуклофамин, агонисты, поэтому необходимо помнить о возможных нежелательных побочных эффектах. Врач может контролировать концентрацию этих веществ в крови. Одновременное применение препарата Форцил с противораковыми средствами не рекомендуется. Влияние на результаты клинического обследования: действие препарата Форцил может привести к ложноположительному результату бактериологического исследования на выявление возбудителя туберкулеза. Лечащие пациенты врач назначает дозу, соответствующую тяжести заболевания и состоянию почек. Применение в педиатрии Так как таблета нельзя измельчать, они не предназначены для лечения детей, которые не способны их глотать. У пациентов с затрудненным глотанием, а также у детей, можно использовать другую лекарственную форму ципрофлоксацина. Учитывая имеющиеся данные, имеется риск повреждения хрящей суставов у детей и подростков. Во время беременности и при лактации Безопасность. Отсутствуют данные, указывающие на влияние внутриутробного развития плода или новорожденного, но учитывая данные исследований на животных, невозможно исключить повреждение суставных хрящей у плода новорожденных или новорожденных. В качестве меры предосторожности, следует избегать применения препарата Форцил в период беременности. Кормление грудью Ципрофлоксацин проникает в материнское молоко. Из-за возможного риска повреждения суставов ребенка, препарат Форцил не следует применять в период кормления грудью. Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами. Точные эффекты ципрофлоксацина со стороны нервной системы могут повлиять на скорость реакции, поэтому может быть нарушена способность управлять автомобилем или работать с механизмами.	