ЛЕВОЯПС

ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ (Қосымша парақ)

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті» РММ терағасының 2025 жылғы «17» шілде №N087572 бұйрығымен **БЕКІТІЛГЕН**

Саудалық атауы
ЛЕВОЯПС

Халықаралық патенттелмеген атауы
Левофлоксацин

Дәрілік түрі, дозасы
Үлгірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 500 мг

Фармакотерапиялық тобы
Жүйелі пайдалануға арналған инфекцияға қарсы препараттар. Жүйелі қолдануға арналған бактерияға қарсы препараттар. Микробқа қарсы препараттар – хинолон туындылары. Фторхинолондар. Левофлоксацин.
АТХ коды J01MA12

Қолданылуы
ЛЕВОЯПС препараты келесі инфекцияларды емдеу үшін ересектерде қолдануға арналған:
- жедел пиелонефрит және несеп шығару жолдарының асқынған инфекциялары
- созылмалы бактериялық простатит
- сібір ойық жарасы: жанасудан кейінгі профилактика және радикалды емдеу

Төменде аталған аурулар кезінде, ЛЕВОЯПС препаратын әдетте осы аурулардың бастапқы емі үшін ұсынылатын бактерияға қарсы дәрілерді пайдалану мүмкін болмаған жағдайда ғана қолдану керек:
- жедел бактериялық синусит
- созылмалы бронхиттің қозуы, өкпенің созылмалы обструкциялық ауруының өршуі
- ауруханадан тыс пневмония
- терінің және жұмсақ тіндердің асқынған инфекциялары
- асқынбаған цистит.

ЛЕВОЯПС препараты сондай ақ левофлоксацинді вена ішіне енгізумен бастапқы емдеуде жақсарғы байқалған пациенттерде емніқ курсын жалғастыру үшін пайдаланылуы мүмкін.
Бактерияға қарсы препараттарды қолдану жөніндегі ұлттық нұсқаулық ұсынымдарын орындау қажет.

Қолдануды бастағанға дейін қажетті мәліметтер тізбесі
Қолдануға болмайтын жағдайлар
- левофлоксацинге, басқа хинолондарға немесе қосымша заттардың кез келгеніне ғана жоғары сезімталдық
- эпилепсиясы бар пациенттерге
- фторхинолондарды қабылдаумен байланысты анамнезінде тендинитпен ауыратын пациенттерге
- жүктілік және бала емізу кезеңі
- 18 жасқа дейінгі балалар мен жасеспірімдер.

Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуі
Басқа дәрілік заттардың ЛЕВОЯПС препаратына әсері
Темір тұздары, мырыш тұздары, құрамында магний немесе алюминий бар антацидтік препараттар, didanozin: құрамында темір, мырыш тұздары, магний немесе алюминий бар антацидтік препараттармен не диданозинмен (құрамында алюминий немесе магниймен буферлік заттар бар диданозиннің дәрілік түрлерімен) немесе құрамында мырыш бар поливитаминді препараттармен бір мезгілде қолданған кезде ЛЕВОЯПС препаратының әсері едәуір өзгереді. Құрамында мырыш бар мультивитаминдермен фторхинолондарды бір мезгілде енгізу олардың пероральді сіңуін (ішке қабылданатын заттардың сіңуін) төмендетуі мүмкін. Бұл препараттарды ЛЕВОЯПС таблеткаларын қабылдауға дейін 2 сағат бұрын және одан кейін қабылдамау ұсынылады. Кальций тұздары левофлоксацин таблеткаларының сіңуіне, ішке қабылдағанған кейін өте аз әсер етеді.
Сукральфат: ЛЕВОЯПС препаратының әсерін әлсіретеді, сондықтан ЛЕВОЯПС таблеткаларын қабылдағанған кейін 2 сағаттан соң сукральфатты қабылдау қажет.
Теофиллин, фенбуфен немесе басқа да стероидты емес қабынуға қарсы препараттар: өзара әсері анықталған жоқ, бірақ құрысуға дайындық шегінің айтарлықтай жоғарылауы байқалуы мүмкін.
Пробенецид және циметидин: ЛЕВОЯПС препаратының әсер етуін күшейтуі мүмкін, сондықтан оларды бір мезгілде қолданған кезде, әсіресе бүйрек жетіспеушілігі бар пациенттерде қақ болу керек.
Басқа маңызды ақпарат
Фармакокинетикалық өзара әрекеттесу зерттеулерінде левофлоксацин теофиллиннің фармакокинетикасына (CYP1A2 маркерлік субстраты) әсер етпеді, бұл левофлоксациннің CYP1A2 тежегіші емес екенін көрсетеді.
Өзара әрекеттесудің басқа түрлері
Тағам: ЛЕВОЯПС препаратының әсеріне ықпал етпейді, сондықтан ЛЕВОЯПС таблеткаларын тағамға қарамастан қабылдауға болады.
Арнайы ескертулер
Құрамында хинолон немесе фторхинолон бар дәрілік заттарды бұрын пайдалану кезінде күрделі жағымсыз әсерлер туындаған пациенттер левофлоксацинді қолданудан аулақ болу керек. Бұл пациенттерді левофлоксацинмен емдеуді баламалы ем бойынша емдеу кезінде пайдалануға арналғанын анықтау маңызды. Бұл пациенттерді левофлоксацинмен емдеуді бастамас бұрын ЛЕВОЯПС препаратының пайдасы мен тәуекелін салыстыру маңызды.
Тәуекілдік қаупі: ЛЕВОЯПС препаратын метициллин-тұрақты алтын түстес стафилококктен туындаған белгілі немесе күдікті инфекцияларды емдеу кезінде қолдану ұсынылмайды, себебі қоздырғыштың левофлоксацинмен әсеріне тәзімділігіне байланысты емдеудің тиімсіз болуы ықтималдығы жоғары (қоздырғыштың препаратқа сезімталдығын анықтау ұсынылады).
ЛЕВОЯПС препаратын *жедел бактериялық синуситті және созылмалы бронхиттің асқынуын* емдеу кезінде осы аурулардың дұрыс диагностикағанан жағдайда қолдануға болады.
Ішек таяқшасының *(E.coli)* левофлоксацинге тәзімділігінің кең таралуына байланысты *несеп шығару жолдарының инфекцияларын* емдеуде сезімталдықты анықтау үшін зертханалық зерттеу жүргізген жөн.
Сібір ойық жарасы: бұл ауру кезінде левофлоксацинді қолдану тәжірибесі жеткіліксіз. Емдеуші дәрігерлер сібір ойық жарасын емдеуге арналған ұлттық және/немесе халықаралық ұсыныстарды басшылыққа алуы тиіс.
Дәрілік препаратқа ұзақ, қайтымсыз жұлдері жағымсыз реакциялар: жасына және бұрын болған қауіп факторларына қарамастан, организмнің әртүрлі, кейде бірнеше жүйелеріне әсер ететін (тірек-қимыл аппараты, жүйке жүйесі, психиатриялық және сенсорлық бұзылыстар) ұзақ (бірнеше ай немесе жыл жалғасатын), өлімге әкелетін және әлеуетті қайтымсыз күрделі жағымсыз реакциялар жағдайлары өте сирек байқалған. Кез келген күрделі жағымсыз реакцияның алғашқы белгілері кезінде ЛЕВОЯПС препаратын қабылдауды дереу тоқтату қажет.
Сінірдің қабынуы (тендинит) және үзілуі: сирек жағдайларда сінірдің қабынуы дамуы мүмкін (тендинит). Көбінесе жіі ахиллов сінірі зақымданады, сінірдің қабынуы оның үзілуіне әкелуі мүмкін. Сінірлердің қабынуы мен үзілуі тек ахиллов сінірімен ғана шектелмейді, кейбір жағдайларда ол тіпті екі жақты болуы мүмкін және хинолондар мен фторхинолондармен емдеуді бастағаннан кейінгі алғашқы 48 сағатта дамуы мүмкін. Кортикостероидты препараттармен бір мезгілде қабылдаған кезде ағзалары трансплантациялаудан кейін 1000 мг левофлоксацинмен емделуде қауіп артады. Кортикостероидтар бір мезгілде қолданудан кезде ағзалары трансплантациялаудан кейін 1000 мг левофлоксацинмен күнделікті дозаларын қабылдайтын едік жастағы пациенттерде, бүйрек жетіспеушілігі бар пациенттерде сінірлердің қабынуы мен үзілу қаупі артады. Кортикостероидтар бір мезгілде қолданудан аулақ болу керек.
Сінірдің қабынуының алғашқы белгілері кезінде (мысалы, ауырсынған ісіну кезінде) ЛЕВОЯПС препаратын қолдануды дереу тоқтату және дереу дәрігерге қаралу қажет. Мұндай жағдайларда емделуді тәуезу және зақымдалған сінірдің қозғалмайтындығын қамтамасыз ету қажет (иммобилизация).
Егер сінірдің қабыну белгілері пайда болса, кортикостероидтар қолданылмауы тиіс. Едік жастағы пациенттер үшін дәрігер бүйрек жағдайын ескере отырып (креатинин клиренсіне сәйкес) препараттың қолайлы тәулігін дозасын тандайды. Левофлоксацинді тағайындағанған кейін пациенттердің жағдайын мұқият мониторингілеу қажет.
Миоклонус
Левофлоксацин қабылдаған пациенттерде миоклонус жағдайлары туралы хабарланды. ("Жағымсыз реакциялар" бөлімін қараңыз). Егер левофлоксацин дозасы креатинин клиренсіне сәйкес реттелмесе, едік жастағы пациенттерде және бүйрек функциясы бұзылған пациенттерде миоклонустың даму қаупі артады. Миоклонус алғаш пайда болған кезде левофлоксацинді қабылдауды дереу тоқтатып, тиісті емдеуді бастау керек.
Пациент бұлшықеттердің кенеттен еріксіз тартылуы, тартылуы немесе бұлшықеттердің жиырылары пайда болған жағдайда дереу дәрігерге жүгіну керектігі туралы болуы тиіс, себебі бұл жағдайлар миоклонустың белгісі болуы мүмкін
Клостридиум дифициледен туындаған ішектің қабыну ауруы (Clostridium difficile): жиі сұйық нәжіс (диарея), әсіресе ұзақ байқалатын және/немесе қан аралас нәжіс, ЛЕВОЯПС препаратымен емдеу кезінде немесе одан кейін (емдеу аяқталғанған кейін бірнеше апта ішінде), клостридиум дифициледен туындаған ішектің қабыну симптомы болуы мүмкін.
Ауру әр түрлі ауырлық дәрежесінде болуы мүмкін, жеңілден өміріне қауіп төндіретін ауырға дейін, ең ауыр түрі-жалған жарғақшалы колит болып табылады (жуан ішектің жедел ауруы). Егер сізде ЛЕВОЯПС препаратын қолдану кезінде немесе кейін жиі сұйық нәжіс (ауыр диарея) пайда болса, препаратты қолдануды дереу тоқтату және дереу дәрігерге қаралу қажет. Бұл ауру кезінде ішектің перистальтикасын әлсірететін препараттарды қолдануға болмайды.
Құрысулардың дамуына бейімділік пациенттер: осы топтың препараттары қабылдық шегін төмендетіп, құрысулардың дамуына тұрті болуы мүмкін, сондықтан ЛЕВОЯПС препаратын эпилепсия кезінде қолдануға болмайды. Құрысулың дамуына бейімділік болған кезде немесе құрысуға дайындық шегін төмендететін дәрілік заттарды (мысалы, теофиллин) бір мезгілде қолданған кезде ерекше сақтық қажет. Құрысу ұстамалары дамыған жағдайда ЛЕВОЯПС препаратынен емдеуді тоқтату және дәрігерге қаралу қажет.
Қан жасушаларының мөлшеры бұзылуына байланысты (глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа жетіспеушілігі): хинолондар тобындағы бактерияға қарсы препараттармен емдеу кезінде кейбір пациенттерде гемолиздік реакцияларға бейімділік байқалды (қан жасушаларының мөрзімінен бұрын бұзылуына және қан аздығының дамуына). Осылайша, мұндай пациенттерде ЛЕВОЯПС препаратын қолдану қажет болған жағдайда оларды гемолиздің дамуы мүмкін болғандығын бақылау қажет (қан плазмасындағы қызыл қан жасушаларының (эритроциттердің) патологиялық бұзылу процессі)).
Бүйрек жетіспеушілігі бар пациенттер: левофлоксацин организмнен негізінен бүйрекпен шығарылатындықтан, бүйрек жетіспеушілігі бар пациенттер ЛЕВОЯПС препаратының дозасын түзетуді қажет етеді.
Аллергиялық реакциялар: левофлоксацин ауыр және өмірге қауіп төндіретін аллергиялық реакцияларды (мысалы, тершің, тершеңсіз шеңмайшың және шырышты қабықтардың айқын ісінуінің дамуымен (анафилактикалық шоққа дейінгі, ангионевроздық (ісіну) тыдырыс мумкін, олар кейде препараттың бірінші дозасын енгізілмен кейін де дамиды. Мұндай реакция дамыған жағдайда емдеуді дереу тоқтату және шұғыл көмек көрсету үшін емдеуші дәрігермен немесе жедел жәрдем дәрігерімен хабарласу қажет.
Терінің ауыр жағымсыз реакциялары: левофлоксацинді қолданған кезде бөртпенің түзілуімен терінің аллергиялық қабынуын, теріде үлкен жаппақ күлдіреуіктердің дамуын және ашық қызыл түсті ауқымды эрозияның дамуын қоса, ауыр жағымсыз тері реакциялары (уытты эпидермалді некролиз, оны Лайелл синдромы деп те атайды), тері-дәгі және шырыштағы бөртпемен жедел уытты-аллергиялық ауру (Стивенс-Джонсон синдромы) және қандағы эозинофилдер санының ұлғаюмен және ішкі ағзалар тарапынан көріністермен дәрілік реакциялар байқалды (DRESS-синдромы). Бұл реакциялар өмірге қауіпті немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Пациенттер тері-дәгі реакцияларының көріністері туралы білуі керек және емдеу кезеңінде дәрігердің мұқият бақылауында болуы керек. Егер жоғарыда аталған симптомдар пайда болса, ЛЕВОЯПС препаратын қабылдауды дереу тоқтату және дереу дәрігерге қаралу қажет. Егер бұрын левофлоксацинге күдделі тері реакциялары байқалса, ЛЕВОЯПС препаратын одан әрі қолдануға болмайды.
Қандағы глюкоза деңгейінің бұзылуы (дисгликемия): глюкоза деңгейінің төмендеуін де (гипогликемия) және деңгейінің жоғарылауын да қоса (гипергликемия), оның қандағы деңгейінің бұзылуы мүмкін. Бұл көбінесе қандағы глюкозаны төмендету үшін бір мезгілде пероральді препараттарды (мысалы, глибенкламид) немесе инсулин қабылдайтын едік жастағы пациенттерде, қант диабеті бар пациенттерде байқалған. Гипогликемиялық кома (қандағы қант деңгейінің күрт төмендеуінен және мидағы жедел энергия тапшылығынан туындаған өмірге қауіп төндіретін жағдай) жағдайлары туралы хабарланған, сондықтан қант диабет кезінде қандағы глюкоза деңгейін бақылау қажет.
Егер пациент қандағы глюкоза деңгейінің бұзылғаны туралы хабарласа, ЛЕВОЯПС препаратымен емдеуді дереу тоқтату керек және фторхинолонды қолданбай бактерияға қарсы басқа емді қолдану мүмкіндігін қарастыру керек.
Терінің күн сәулесіне реакциялары (фотосенсибилизация): левофлоксацинді қолданған кезде терінің күн сәулесіне реакциясы дамуы мүмкін. Олардың алдын алу үшін емдеу кезеңінде және ЛЕВОЯПС препаратын қабылдауды тоқтатқанған кейін 48 сағат бойы күшті күн сәулесінің немесе жасанды УК сәулеленуінің (мысалы, қыздырғыр арналған шамдар, солярий) әсеріне ұшырамау ұсынылады.
К дәрменінің антагонистерін бір мезгілде қабылдау (мысалы, варфарин): қан ұюының нашарлауы және/немесе қан кету дамуы мүмкін (протромбин уақыты/ *халықаралық қалыптасқан қатынас*), сондықтан варфаринмен бір мезгілде емделтенде қанның ұю көрсеткіштерін зертханалық бақылау қажет.
Психоздық реакциялар: психоздық реакциялар дамуы мүмкін (көбінесе бұрын психоз немесе психиатриялық аурулар болған кезде). Өте сирек жағдайларда одан левофлоксациннің бірінші дозасын қабылдағанған кейін де дамуы мүмкін. Мұндай реакциялар пациенттің өзіне қауіп төндіретін суицидтік ойлар мен мінез-құлық пайда болғанға дейін ерішуі мүмкін. Мұндай реакциялар пайда болған жағдайда ЛЕВОЯПС препаратын қабылдауды жедел тоқтату және дереу дәрігерге бару керек.
Фторхинолонсызы бактерияға қарсы басқа емдеу мүмкіндігін қарастырып, тиісті шараларды қабылдау керек.
Левофлоксацинді психозы бар немесе бұрын психиатриялық аурулары бар пациенттерге сақтықпен қолдану керек.
ЭКГ -ғағы өзгерістер- QT аралығының ұзаруы: левофлоксацинді QT аралығы ұзарушың қауіп факторлары және осыған байланысты жүрек ырғағының бұзылулары болған кезде сақтықпен қолдану қажет:
- QT аралығы ұзарушың тұқымқұмы бар пациенттерде
- QT аралығы ұзарушын тұдыратын дәрілік препараттарды бір мезгілде қолдану (мысалы, IA және III класты аритмияға қарсы препараттар, трициклді антидепрессанттардың, макролидтер тобының антибиотиктерінің, ауыр аритмияның дамуымен жүректің жиырылу функциясына психозға қарсы препараттардың (нейролептиктер) әсері күшеюі мүмкін.

Басқа маңызды ақпарат
Фармакокинетикалық өзара әрекеттесу зерттеулерінде левофлоксацин теофиллиннің фармакокинетикасына (CYP1A2 маркерлік субстраты) әсер етпеді, бұл левофлоксациннің CYP1A2 тежегіші емес екенін көрсетеді.
Өзара әрекеттесудің басқа түрлері
Тағам: ЛЕВОЯПС препаратының әсеріне ықпал етпейді, сондықтан ЛЕВОЯПС таблеткаларын тағамға қарамастан қабылдауға болады.
Арнайы ескертулер
Құрамында хинолон немесе фторхинолон бар дәрілік заттарды бұрын пайдалану кезінде күрделі жағымсыз әсерлер туындаған пациенттер левофлоксацинді қолданудан аулақ болу керек. Бұл пациенттерді левофлоксацинмен емдеуді баламалы ем бойынша емдеу кезінде пайдалануға арналғанын анықтау маңызды. Бұл пациенттерді левофлоксацинмен емдеуді бастамас бұрын ЛЕВОЯПС препаратының пайдасы мен тәуекелін салыстыру маңызды.
Тәзімділік қаупі: ЛЕВОЯПС препаратын метициллин-тұрақты алтын түстес стафилококктен туындаған белгілі немесе күдікті инфекцияларды емдеу кезінде қолдану ұсынылмайды, себебі қоздырғыштың левофлоксацинмен әсеріне тәзімділігіне байланысты емдеудің тиімсіз болуы ықтималдығы жоғары (қоздырғыштың препаратқа сезімталдығын анықтау ұсынылады).
ЛЕВОЯПС препаратын *жедел бактериялық синуситті және созылмалы бронхиттің асқынуын* емдеу кезінде осы аурулардың дұрыс диагностикағанан жағдайда қолдануға болады.
Ішек таяқшасының *(E.coli)* левофлоксацинге тәзімділігінің кең таралуына байланысты *несеп шығару жолдарының инфекцияларын* емдеуде сезімталдықты анықтау үшін зертханалық зерттеу жүргізген жөн.
Сібір ойық жарасы: бұл ауру кезінде левофлоксацинді қолдану тәжірибесі жеткіліксіз. Емдеуші дәрігерлер сібір ойық жарасын емдеуге арналған ұлттық және/немесе халықаралық ұсыныстарды басшылыққа алуы тиіс.
Дәрілік препаратқа ұзақ, қайтымсыз жұлдері жағымсыз реакциялар: жасына және бұрын болған қауіп факторларына қарамастан, организмнің әртүрлі, кейде бірнеше жүйелеріне әсер ететін (тірек-қимыл аппараты, жүйке жүйесі, психиатриялық және сенсорлық бұзылыстар) ұзақ (бірнеше ай немесе жыл жалғасатын), өлімге әкелетін және әлеуетті қайтымсыз күрделі жағымсыз реакциялар жағдайлары өте сирек байқалған. Кез келген күрделі жағымсыз реакцияның алғашқы белгілері кезінде ЛЕВОЯПС препаратын қабылдауды дереу тоқтату керек.
Сінірдің қабынуы (тендинит) және үзілуі: сирек жағдайларда сінірдің қабынуы дамуы мүмкін (тендинит). Көбінесе жіі ахиллов сінірі зақымданады, сінірдің қабынуы оның үзілуіне әкелуі мүмкін. Сінірлердің қабынуы мен үзілуі тек ахиллов сінірімен ғана шектелмейді, кейбір жағдайларда ол тіпті екі жақты болуы мүмкін және хинолондар мен фторхинолондармен емдеуді бастағаннан кейінгі алғашқы 48 сағатта дамуы мүмкін. Кортикостероидты препараттармен бір мезгілде қабылдаған кезде ағзалары трансплантациялаудан кейін 1000 мг левофлоксацинмен күнделікті дозаларын қабылдайтын едік жастағы пациенттерде, бүйрек жетіспеушілігі бар пациенттерде сінірлердің қабынуы мен үзілу қаупі артады. Кортикостероидтар бір мезгілде қолданудан аулақ болу керек.
Сінірдің қабынуының алғашқы белгілері кезінде (мысалы, ауырсынған ісіну кезінде) ЛЕВОЯПС препаратын қолдануды дереу тоқтату және дереу дәрігерге қаралу қажет. Мұндай жағдайларда емделуді тәуезу және зақымдалған сінірдің қозғалмайтындығын қамтамасыз ету қажет (иммобилизация).
Егер сінірдің қабыну белгілері пайда болса, кортикостероидтар қолданылмауы тиіс. Едік жастағы пациенттер үшін дәрігер бүйрек жағдайын ескере отырып (креатинин клиренсіне сәйкес) препараттың қолайлы тәулігін дозасын тандайды. Левофлоксацинді тағайындағанған кейін пациенттердің жағдайын мұқият мониторингілеу қажет.
Миоклонус
Левофлоксацин қабылдаған пациенттерде миоклонус жағдайлары туралы хабарланды. ("Жағымсыз реакциялар" бөлімін қараңыз). Егер левофлоксацин дозасы креатинин клиренсіне сәйкес реттелмесе, едік жастағы пациенттерде және бүйрек функциясы бұзылған пациенттерде миоклонустың даму қаупі артады. Миоклонус алғаш пайда болған кезде левофлоксацинді қабылдауды дереу тоқтатып, тиісті емдеуді бастау керек.
Пациент бұлшықеттердің кенеттен еріксіз тартылуы, тартылуы немесе бұлшықеттердің жиырылары пайда болған жағдайда дереу дәрігерге жүгіну керектігі туралы хабардар болуы тиіс, себебі бұл жағдайлар миоклонустың белгісі болуы мүмкін
Клостридиум дифициледен туындаған ішектің қабыну ауруы (Clostridium difficile): жиі сұйық нәжіс (диарея), әсіресе ұзақ байқалатын және/немесе қан аралас нәжіс, ЛЕВОЯПС препаратымен емдеу кезінде немесе одан кейін (емдеу аяқталғанған кейін бірнеше апта ішінде), клостридиум дифициледен туындаған ішектің қабыну симптомы болуы мүмкін.
Ауру әр түрлі ауырлық дәрежесінде болуы мүмкін, жеңілден өміріне қауіп төндіретін ауырға дейін, ең ауыр түрі-жалған жарғақшалы колит болып табылады (жуан ішектің жедел ауруы). Егер сізде ЛЕВОЯПС препаратын қолдану кезінде немесе кейін жиі сұйық нәжіс (ауыр диарея) пайда болса, препаратты қолдануды дереу тоқтату және дереу дәрігерге қаралу қажет. Бұл ауру кезінде ішектің перистальтикасын әлсірететін препараттарды қолдануға болмайды.
Құрысулардың дамуына бейімділік пациенттер: осы топтың препараттары қабылдық шегін төмендетіп, құрысулардың дамуына тұрті болуы мүмкін, сондықтан ЛЕВОЯПС препаратын эпилепсия кезінде қолдануға болмайды. Құрысулың дамуына бейімділік болған кезде немесе құрысуға дайындық шегін төмендететін дәрілік заттарды (мысалы, теофиллин) бір мезгілде қолданған кезде ерекше сақтық қажет. Құрысу ұстамалары дамыған жағдайда ЛЕВОЯПС препаратынен емдеуді тоқтату және дәрігерге қаралу қажет.
Қан жасушаларының мөлшеры бұзылуына байланысты (глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа жетіспеушілігі): хинолондар тобындағы бактерияға қарсы препараттармен емдеу кезінде кейбір пациенттерде гемолиздік реакцияларға бейімділік байқалды (қан жасушаларының мөрзімінен бұрын бұзылуына және қан аздығының дамуына). Осылайша, мұндай пациенттерде ЛЕВОЯПС препаратын қолдану қажет болған жағдайда оларды гемолиздің дамуы мүмкін болғандығын бақылау қажет (қан плазмасындағы қызыл қан жасушаларының (эритроциттердің) патологиялық бұзылу процессі)).
Бүйрек жетіспеушілігі бар пациенттер: левофлоксацин организмнен негізінен бүйрекпен шығарылатындықтан, бүйрек жетіспеушілігі бар пациенттер ЛЕВОЯПС препаратының дозасын түзетуді қажет етеді.
Аллергиялық реакциялар: левофлоксацин ауыр және өмірге қауіп төндіретін аллергиялық реакцияларды (мысалы, тершің, тершеңсіз шеңмайшың және шырышты қабықтардың айқын ісінуінің дамуымен (анафилактикалық шоққа дейінгі, ангионевроздық (ісіну) тыдырыс мумкін, олар кейде препараттың бірінші дозасын енгізілмен кейін де дамиды. Мұндай реакция дамыған жағдайда емдеуді дереу тоқтату және шұғыл көмек көрсету үшін емдеуші дәрігермен немесе жедел жәрдем дәрігерімен хабарласу қажет.
Терінің ауыр жағымсыз реакциялары: левофлоксацинді қолданған кезде бөртпенің түзілуімен терінің аллергиялық қабынуын, теріде үлкен жаппақ күлдіреуіктердің дамуын және ашық қызыл түсті ауқымды эрозияның дамуын қоса, ауыр жағымсыз тері реакциялары (уытты эпидермалді некролиз, оны Лайелл синдромы деп те атайды), тері-дәгі және шырыштағы бөртпемен жедел уытты-аллергиялық ауру (Стивенс-Джонсон синдромы) және қандағы эозинофилдер санының ұлғаюмен және ішкі ағзалар тарапынан көріністермен дәрілік реакциялар байқалды (DRESS-синдромы). Бұл реакциялар өмірге қауіпті немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Пациенттер тері-дәгі реакцияларының көріністері туралы білуі керек және емдеу кезеңінде дәрігердің мұқият бақылауында болуы керек. Егер жоғарыда аталған симптомдар пайда болса, ЛЕВОЯПС препаратын қабылдауды дереу тоқтату және дереу дәрігерге қаралу қажет. Егер бұрын левофлоксацинге күдделі тері реакциялары байқалса, ЛЕВОЯПС препаратын одан әрі қолдануға болмайды.
Қандағы глюкоза деңгейінің бұзылуы (дисгликемия): глюкоза деңгейінің төмендеуін де (гипогликемия) және деңгейінің жоғарылауын да қоса (гипергликемия), оның қандағы деңгейінің бұзылуы мүмкін. Бұл көбінесе қандағы глюкозаны төмендету үшін бір мезгілде пероральді препараттарды (мысалы, глибенкламид) немесе инсулин қабылдайтын едік жастағы пациенттерде, қант диабеті бар пациенттерде байқалған. Гипогликемиялық кома (қандағы қант деңгейінің күрт төмендеуінен және мидағы жедел энергия тапшылығынан туындаған өмірге қауіп төндіретін жағдай) жағдайлары туралы хабарланған, сондықтан қант диабет кезінде қандағы глюкоза деңгейін бақылау қажет.
Егер пациент қандағы глюкоза деңгейінің бұзылғаны туралы хабарласа, ЛЕВОЯПС препаратымен емдеуді дереу тоқтату керек және фторхинолонды қолданбай бактерияға қарсы басқа емді қолдану мүмкіндігін қарастыру керек.
Терінің күн сәулесіне реакциясы (фотосенсибилизация): левофлоксацинді қолданған кезде терінің күн сәулесіне реакциясы дамуы мүмкін. Олардың алдын алу үшін емдеу кезеңінде және ЛЕВОЯПС препаратын қабылдауды тоқтатқанған кейін 48 сағат бойы күшті күн сәулесінің немесе жасанды УК сәулеленуінің (мысалы, қыздырғыр арналған шамдар, солярий) әсеріне ұшырамау ұсынылады.
К дәрменінің антагонистерін бір мезгілде қабылдау (мысалы, варфарин): қан ұюының нашарлауы және/немесе қан кету дамуы мүмкін (протромбин уақыты/ *халықаралық қалыптасқан қатынас*), сондықтан варфаринмен бір мезгілде емделтенде қанның ұю көрсеткіштерін зертханалық бақылау қажет.
Психоздық реакциялар: психоздық реакциялар дамуы мүмкін (көбінесе бұрын психоз немесе психиатриялық аурулар болған кезде). Өте сирек жағдайларда одан левофлоксациннің бірінші дозасын қабылдағанған кейін де дамуы мүмкін. Мұндай реакциялар пациенттің өзіне қауіп төндіретін суицидтік ойлар мен мінез-құлық пайда болғанға дейін ерішуі мүмкін. Мұндай реакциялар пайда болған жағдайда ЛЕВОЯПС препаратын қабылдауды жедел тоқтату және дереу дәрігерге бару керек.
Фторхинолонсызы бактерияға қарсы басқа емдеу мүмкіндігін қарастырып, тиісті шараларды қабылдау керек.
Левофлоксацинді психозы бар немесе бұрын психиатриялық аурулары бар пациенттерге сақтықпен қолдану керек.
ЭКГ -ғағы өзгерістер- QT аралығының ұзаруы: левофлоксацинді QT аралығы ұзарушың қауіп факторлары және осыған байланысты жүрек ырғағының бұзылулары болған кезде сақтықпен қолдану қажет:
- QT аралығы ұзарушың тұқымқұмы бар пациенттерде
- QT аралығы ұзарушын тұдыратын дәрілік препараттарды бір мезгілде қолдану (мысалы, IA және III класты аритмияға қарсы препараттар, трициклді антидепрессанттардың, макролидтер тобының антибиотиктерінің, психозға қарсы препараттар (нейролептиктер))
- қарының тұз құрамының бұзылуы (мысалы, калий немесе магний деңгейінің төмендеуі (гипокалиемия немесе гипомагниемия)
- жүрек аурулары (мысалы, жүрек жеткіліксіздігі, миокард инфарктісі, сирек жүрек ырғағы (брадикардия).

Еде жастағы пациенттер мен әйелдер жүрек ырғағының бұзылуын тұдыратын препараттарға сезімтал, сондықтан пациенттердің осы топтарында фторхинолондарды, соның ішінде левофлоксацинді қолданғанда сақ болу керек.
Шеткері жүйке аурулы (шеткері нейропатия): хинолондар мен фторхинолондарды қабылдайтын пациенттерде ашыту, шаншу, тіпрекну (парестезия), терінің тіпрендіргіштерге немесе тіпрендіргіштерге сезімтал (гиперестезия), диэстезия (сезімталдықтың бұрмалануы) немесе бұлшықет әлсіздігі сезімдерімен әртүрлі сезімталдықтың бұзылуына әкелетін шеткері жүйке ауруларының (сенсорлық немесе сенсомоторлы полиневропатия) дамуы мүмкін. Ауырсыну, ашыту, шаншу, үю немесе бұлшықет әлсіздігі сияқты қайтымсыз сезімталдық бұзылуларының дамуын болдырмау үшін емдеуді жағластырмас бұрын емдеуші дәрігерге хабарлау керек.
Бауыр мен өт шығару жолдары тарапынан бұзылулар (гепатобилиарлық бұзылыстар): левофлоксацинді қолданған кезде негізінен күрделі негізгі ауру мысалы, сепсистің аясында бауыр некрозының өлімнен аяқталатын бауыр жеткіліксіздігіне дейін дамуы байқалды. Тәбеттің толық болмауы (анорексия), тері мен шырышты қабықтың сарғаюы (сарғаю), несептің күңгірттенуі, қышыну және ұстың ауыруы сияқты бауыр ауруының белгілері пайда болған кезде ЛЕВОЯПС препаратымен емдеуді тоқтату және дәрігерге қаралу қажет.
Миастениялық ауруы: егер миастения болса, өлім жағдайларын және өкпені қосымша жасанды желдету қажеттілігін қоса, күрделі жағымсыз реакциялардың дамуына дейін әкелетін бұлшықет әлсіздігінің күшеюі мүмкін, сондықтан миастения кезінде ЛЕВОЯПС препаратын қолдану ұсынылмайды.
Көру қабілетінің бұзылуы: көру қабілетінің бұзылуы немесе көзге қандай да бір әсер пайда болған жағдайда, дереу офтальмологқа қаралу керек.
Сезімтал емес микроорганизмдердің көбейіп өсуі (суперинфекция немесе екіншілік инфекция): препараты ұзақ қолдану кезінде болуы мүмкін. Емдеу кезеңінде суперинфекция дамыған кезде ЛЕВОЯПС препаратын қабылдауды тоқтатып, дәрігерге қаралу керек.
Зертханалық зерттеу нәтижелеріне әсері: несепте апиницардың болуына талдау жалған оң нәтиже беруі мүмкін. Бұл нәтижелерді басқа, барынша спецификалық әдістемен растау қажет болуы мүмкін.
ЛЕВОЯПС препараты туберкулез қоздырғышының *(Mycobacterium tuberculosis)* өсуін басуы және туберкулезге бактериологиялық сеппенің жалған теріс нәтижесін беруі мүмкін.
Аневризма және қолқаның ыдырауы, сондай-ақ жүрек қапандарының реугритациясы/жетіспеушілігі: левофлоксацинді қабылдаған кезде әсіресе егде жаста аневризманың дамуы және қолқаның ыдырауы, сонымен қатар қолқа қапанының реугритациясы (әр бір жүрек цикл кезінде, ол жақ қарынша босаңсыған кезде қанның қолқа қапанды арқылы сол жақ қарыншаға кері ағуы) және митралды қапанның реугритациясы (систола кезінде қанның сол жақ қарыншадан сол жақ жүрекшеге кері ағуы – жүрек бұлшықетінің жиырылуы) қауіп жоғары болады.
Аневризма мен қолқаның ыдырауының белгілі жағдайлары бар, кейде жыртылумен (соның ішінде өліммен), сондай-ақ фторхинолондарды қабылдау кезінде жүрек қапандарының кез келгеніне реугритациясы/жетіспеушілігімен асқынған. Сондықтан, фторхинолондарды аневризмаға немесе жүрек қапандарының тұз біткен ақауларына қатысты ауыр отбасылық анамнезі бар пациенттерде, қолқа аневризмасы және/немесе ыдырауы немесе бұрын жүрек қапандарының жетіспеушілігі бар пациенттерде, сондай-ақ басқа қауіп факторлары болғанда немесе қолқа аневризмасы және/немесе ыдырауы кезінде екі жағдайда да болжамды жай-күйлерде, сондай-ақ жүрек қапандарының реугритациясы/жетіспеушілігінде (мысалы, Марфан синдромы немесе Элерс-Данлос синдромы, Тернер синдромы, Бехчет ауруы сияқты дәнекер тін тарапынан бұзылулар, артериялық гипертензия (артериялық қысымның жоғарылауы), ревматоидты артрит (буындардың қабыну ауруы), сондай-ақ қолқа аневризмасы мен ыдырауы кезінде (мысалы, Такаясу артериит сияқты тамыр аурулары) (қолқаны, оның тармақтарын және өкпе артерияларын зақымдайтын аутоиммунды қабыну аурулары) немесе ашы жасушалы артериит (бастың, мойынның және дененің жоғарғы белігінің ірі және орта артерияларының созылмалы қабынуы) немесе белгілі атеросклероз (тамыр жақтауларына зақым келтіретін созылмалы артерия ауруы) немесе Шегрен синдромы (шығу тегі белгісіз жүйелі аутоиммунды ауру, сыртқы секреция бездерінің зақымдануымен сипатталады, ең алдымен көз жасы, сілекей, тер, май), сондай-ақ жүрек қапандарының реугритациясы/жетіспеушілігі кезінде (мысалы, инфекциялық эндокардит (жүрек қабығының (эндокард), сондай-ақ жүрек қапанының инфекциялық зақымдануы)).
Жүйелік кортикостероидтармен бір мезгілде ем қабылдаған пациенттерде аневризма мен қолқаның ыдырауы, сондай-ақ жарылу қаупі жоғарылауы мүмкін.
Іштің, кеуденің немесе арқаның кенеттен ауыруы пайда болған жағдайда шұғыл көмек көрсету бөлімшесінің дәрігеріне дереу бару керек.
Жедел емтіру, алғаш туындаған жүрек соғуының жиілеуі, сондай-ақ құрсақ қуысының немесе жіпті іс