

ОТИБЕЛС ГАРД

Инструкция по применению

Торговое название: Отибелс Гард.

Международное непатентованное название: комбинированный препарат.

Лекарственная форма: спрей ушной.

Состав:

Оливковое масло до 100%, кунжутное масло 15%, экстракт пальмы сереноа 3%, комплекс фитостеролов бисаболол 3%, масло из листьев мурайи кенига 3%, масло листьев корицы 3%, экстракт морского хлыста 15%, мятное масло 0,1%.

Вспомогательное вещество: каприловый / каприновый триглицерид 1%.

Фармакологическое действие:

Отибелс Гард - ушной спрей обладает антибактериальным, противогрибковым, а также противовоспалительным действиями. Можно применять при лечении ушных инфекций в составе комплексной терапии и в качестве профилактики ушных заболеваний.

Показания к применению:

- взрослым и детям старше 6 месяцев с проблемой частого и быстрого возникновения серных пробок и чрезмерным серообразованием, а также при чрезмерной сухости слухового прохода;
- после грибковых заболеваний или использования ушных анальгетиков и антибиотиков;
- пользователям слуховых аппаратов и ушных гарнитур с целью профилактики образования серных пробок;
- при купании в бассейнах и открытых водоемах для предупреждения ушных инфекций.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- в случаях перфорации барабанной перепонки;
- ушные инфекции;
- детский возраст до 6 месяцев.

Беременность и период лактации:

При использовании препарата во время беременности и/или кормления грудью не выявлено вредных побочных эффектов, однако следует всегда сообщать врачу перед применением препарата в период беременности и/или кормления грудью.

Способ применения и дозы:

При открытии нового флакона необходимо согреть его в ладонях, хорошо взболтать, а затем нажать на распылитель 3–4 раза, пока не появятся брызги спрея.

Взрослым и детям старше 6 месяцев: по 1–2 дозы спрея (1-2 нажатия на распылительную насадку) в пораженное ухо 3 раза в день. Перед применением рекомендуется согреть флакон, подержав его в ладони в течение 1-2 мин.

После каждого использования, снимают насадку и промывают горячей водой.

Побочные действия:

К наиболее частым побочным явлениям при введении средства в ушной проход относят возникновение аллергических реакций - зуд, покраснение, шелушения эпителия. В основном такие процессы обратимы и после отмены медикамента самопроизвольно пропадают, не требуя проведения терапии.

Передозировка:

Данных о передозировке препарата Отибелс Гард нет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Информация о негативных проявлениях комбинированного использования препарата Отибелс Гард и других фармакологических препаратов отсутствует. Перед применением препарата рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Особые указания:

Не применять в случаях потери слуха или наличия инородного тела в ухе.

Не проталкивать наконечник глубоко в слуховой проход, чтобы избежать повреждения.

Если отмечается болезненное ощущение в ухе, перед применением следует проконсультироваться с врачом.

Спрей Отибелс Гард предназначен для использования только в ушном канале. Не распылять возле глаз, носа или рта.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Форма выпуска:

Спрей ушной 15 мл в пластиковой бутылке с распылительной насадкой, вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:

BELINDA Laboratories LLP

Лондон, Великобритания

Производитель:

Naveh Pharma Ltd.

11-19 Yad Charutzim St.,

POB 8139, Нетания 4250519, Израиль.